ЛП-№(002126)-(РГ-RU) от 25.05.2026

ЛП-№002126-ГП-BY
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 07.08.2026 № 911
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0020

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Дифлюкан, 150 мг, капсулы

Действующее вещество: флуконазол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.
Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или медицинской сестры.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Дифлюкан, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Дифлюкан.
3. Прием препарата Дифлюкан.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Дифлюкан.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Дифлюкан, и для чего его применяют

Препарат Дифлюкан содержит действующее вещество флуконазол, относящийся к группе лекарственных средств, называемых «Противогрибковые средства для системного применения. Производные триазола и тетразола».

Показания к применению
Препарат Дифлюкан применяется у взрослых для лечения инфекций, вызываемых грибками. Наиболее частая причина грибковых инфекций – дрожжевой грибок под названием *Candida*. Симптомы молочницы включают зуд, жжение во влагалище и наружных половых органах, а также творожистые выделения.

Ваш врач может назначить Вам данное лекарственное средство для лечения молочницы, инфекции женских или мужских половых органов.

Способ действия препарата
Препарат Дифлюкан действует на клетки грибов, а именно нарушая выработку веществ, необходимых для построения оболочки клетки грибов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Дифлюкан

Противопоказания
Не принимайте препарат Дифлюкан:
- если у Вас аллергия на флуконазол, другие лекарственные средства, которые Вы принимали ранее для лечения грибковых инфекций, или любые другие компоненты

ЛП-№002126-ГП-BY
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 07.08.2026 № 911
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0020

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша); симптомы аллергии могут включать зуд, покраснение кожи или затрудненное дыхание;
- если Вы принимаете астемизол, терфенадин (антигистаминные лекарственные средства для лечения аллергии);
- если Вы принимаете цизаприд (лекарственное средство для лечения расстройства желудка);
- если Вы принимаете пимозид (лекарственное средство для лечения психических заболеваний);
- если Вы принимаете хинидин (лекарственное средство для лечения нарушений ритма сердца);
- если Вы принимаете эритромицин (антибактериальное лекарственное средство для лечения инфекций).

Особые указания и меры предосторожности
Перед приемом препарата Дифлюкан проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:
- у Вас имеются проблемы с печенью или почками;
- Вы страдаете сердечно-сосудистым заболеванием, включая нарушения ритма сердца;
- у Вас нарушено содержание калия, кальция или магния в крови;
- у Вас наблюдалось развитие тяжелых кожных реакций (зуда, покраснения кожи или затрудненного дыхания);
- у Вас развились признаки «недостаточности надпочечников», когда надпочечники не вырабатывают достаточное количество определенных стероидных гормонов, таких как кортизол (хроническая или продолжительная усталость, мышечная слабость, потеря аппетита, потеря веса, боль в животе).
- у Вас когда-либо развивалась выраженная сыпь или шелушения кожи, появление волдырей и/или язв на слизистой оболочке полости рта.

Сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, включая лекарственные реакции с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), связанных с лечением флуконазолом. Прекратите прием препарата Дифлюкан и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если Вы обнаружили любые симптомы, которые могут относиться к описанным выше серьезным кожным реакциям (см. раздел 4).

Поговорите со своим лечащим врачом или работником аптеки, если симптомы грибкового заболевания не исчезают, так как, возможно, потребуется применение альтернативной противогрибковой терапии.

Дети и подростки
Несмотря на то, что данное лекарственное средство предназначено для лечения взрослых, его можно принимать подросткам (в возрасте от 12 до 17 лет) в случае крайней необходимости и отсутствия адекватных альтернативных вариантов терапии. Его следует принимать также, как и у взрослых.

Другие препараты и препарат Дифлюкан
Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Незамедлительно сообщите своему лечащему врачу, если Вы принимаете астемизол, терфенадин (антигистаминные лекарственные средства для лечения аллергии), цизаприд (лекарственное средство для лечения расстройства желудка), пимозид (лекарственное средство для лечения психических заболеваний), хинидин (лекарственное средство для лечения нарушений ритма сердца) или эритромицин (антибактериальное лекарственное средство для лечения инфекции), поскольку их нельзя применять одновременно с препаратом Дифлюкан (см. раздел «Противопоказания»).

ЛП-№002126-ГП-BY
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 07.08.2026 № 911
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0020

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Некоторые лекарственные средства могут взаимодействовать с препаратом Дифлюкан. Убедитесь, что Ваш лечащий врач знает, что Вы принимаете следующие лекарственные средства поскольку может потребоваться коррекция их дозы или мониторинг, чтобы проверить, что препараты все еще оказывают необходимое действие:

- рифампицин или рифабутин (антибактериальные лекарственные средства для лечения инфекций);
- аброцитиниб (применяется для лечения атопического дерматита, также известного как атопическая экзема);
- алфентанил, фентанил (обезболивающие средства);
- амитриптилин, нортриптилин (антидепрессанты);
- амфотерицин В, вориконазол (противогрибковые лекарственные средства);
- лекарственные средства, разжижающие кровь, чтобы предотвратить образование тромбов (варфарин или аналогичные лекарственные средства);
- бензодиазепины (мидазолам, триазолам или аналогичные лекарственные средства) для лечения бессонницы или чувства тревоги;
- карбамазепин, фенитоин (лекарственные средства для лечения судорог);
- нифедипин, исрадипин, амлодипин, верапамил, фелодипин и лозартан (лекарственные средства для лечения повышенного артериального давления);
- олапариб (для лечения злокачественных новообразований яичников);
- циклоспорин, эверолимус, сиролимус или такролимус (лекарственные средства, используемые для предотвращения реакции отторжения трансплантата);
- циклофосфамид, алкалоиды барвинка (винкристин, винбластин или аналогичные лекарственные средства), применяемые для лечения злокачественных новообразований;
- галофантрин (лекарственное средство для лечения малярии);
- статины (аторвастатин, симвастатин и флувастатин или аналогичные лекарственные средства), применяемые для снижения высокого уровня холестерина;
- метадон (лекарственное средство для лечения боли);
- целекоксиб, флурбипрофен, напроксен, ибупрофен, лорноксикам, мелоксикам, диклофенак (нестероидные противовоспалительные средства (НПВС));
- оральные контрацептивы;
- преднизон (стероид);
- зидовудин, также известный как азидотимидин, саквинавир (лекарственные средства для лечения ВИЧ-инфекции);
- лекарственные средства для лечения сахарного диабета, такие как хлорпропамид, глибенкламид, глипизид или толбутамид;
- теофиллин (лекарственное средство для терапии бронхиальной астмы);
- толваптан (используется для лечения гипонатриемии (низкий уровень натрия в крови) или для снижения функции почек);
- тофацитиниб (используется для лечения ревматоидного артрита);
- витамин А (биологически активная добавка);
- ивакафтор (лекарственное средство для лечения муковисцидоза, используется в качестве монотерапии или в комбинации с другими лекарствами);
- амиодарон (используется для лечения нарушения ритма сердца, «аритмии»);
- гидрохлоротиазид (диуретик);
- ибрутиниб (препарат для лечения злокачественных заболеваний крови);
- луразидон (препарат для лечения шизофрении).

Препарат Дифлюкан с пищей и напитками

Препарат можно принимать вне зависимости от приема пищи.

ЛП-№002126-ГП-BY
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 07.08.2026 № 911
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0020

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Беременность и грудное вскармливание
Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность
Если Вы планируете забеременеть, рекомендуется подождать 1 неделю после приема однократной дозы флуконазола до начала попыток забеременеть.

В случае необходимости принимать флуконазол длительно, проконсультируйтесь с лечащим врачом для решения вопроса о наиболее подходящем методе контрацепции во время терапии, использование которого необходимо продолжать в течение 1 недели после приема последней дозы флуконазола.

Вы не должны принимать препарат Дифлюкан во время беременности, думаете, что беременны, или планируете беременность, за исключением случаев, когда Ваш врач назначил Вам препарат Дифлюкан. Если Вы забеременеете во время применения этого препарата или в течение 1 недели после приема его последней дозы, обратитесь к врачу.

Препарат Дифлюкан при применении в первом или втором триместре беременности может повышать риск невынашивания беременности. Флуконазол при применении во время первого триместра беременности может повышать риск рождения ребенка с врожденными пороками развития сердца, костей и/или мышц.

Грудное вскармливание
Вы можете продолжать грудное вскармливание после однократного приема препарата Дифлюкан в дозе 150 мг.

При многократном приеме препарата Дифлюкан не следует кормить ребенка грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
При управлении транспортными средствами и работе с механизмами необходимо иметь в виду, что в некоторых случаях при приеме данного препарата возможно развитие головокружения или судорог.

Препарат Дифлюкан содержит лактозу
Данный лекарственный препарат содержит небольшое количество лактозы (молочный сахар). Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Препарат Дифлюкан содержит натрий
Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия, то есть по сути, «не содержит натрия».

3. Прием препарата Дифлюкан

Рекомендуемая доза
Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки, медицинской сестры. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Взрослые
150 мг в качестве однократной дозы.

Особые группы пациентов
Лица пожилого возраста
Пациентам пожилого возраста назначают стандартные дозы препарата Дифлюкан для взрослых, за исключением случаев нарушения функции почек.

Пациенты с почечной недостаточностью

ЛП-№002126-ГП-BY
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 07.08.2026 № 911
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Следует принимать обычную дозу, как для взрослых.

Пациенты с печеночной недостаточностью
Поскольку информации по применению флуконазола у пациентов с нарушением функции печени недостаточно, следует с осторожностью применять флуконазол у этой категории пациентов.

Как скоро заметен эффект?
Вагинальный кандидоз
В течение нескольких дней симптомы заболевания начинают уменьшаться – некоторые женщины замечают улучшение на следующий день.

Пожалуйста, обратитесь еще раз к своему врачу, если через несколько дней после применения лекарственного средства эффект отсутствует.

Кандидоз у мужчин
Симптомы заболевания начинают уменьшаться в течение нескольких дней, однако это может продлиться до одной недели.

Пожалуйста, обратитесь еще раз к своему врачу, если через одну неделю после применения лекарственного средства эффект отсутствует.

Путь и (или) способ введения
Внутрь. 150 г (1 капсула) однократно.

Капсулу необходимо проглатывать целиком, запивая стаканом воды.

Если Вы приняли препарата Дифлюкан больше, чем следовало
Прием слишком большого количества капсул за один раз может ухудшить Ваше самочувствие. Немедленно обратитесь к своему лечащему врачу или в отделение скорой помощи ближайшей больницы. Симптомы возможной передозировки могут включать искажение слуховых, зрительных, тактильных ощущений и реальности (галлюцинации и параноидальное поведение). При передозировке может быть достаточно проведения симптоматической терапии (в том числе поддерживающих мер и промывания желудка при необходимости).

Если Вы забыли принять препарат Дифлюкан
Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Если Вы забыли принять дозу препарата, примите ее сразу же, как только об этом вспомните. Если уже практически наступило время приема следующей дозы, не принимайте дозу препарата, которую Вы пропустили.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Дифлюкан может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Дифлюкан и **немедленно** обратитесь за медицинской помощью, если Вы заметили любой из следующих симптомов:
- кожная сыпь, покрывающая значительную часть тела, повышение температуры тела и увеличение лимфатических узлов (DRESS синдром или синдром лекарственной гиперчувствительности).

У некоторых пациентов развиваются редкие **аллергические реакции,** хотя серьезные аллергические реакции возникают редко. Если Вы заметили у себя появление каких-либо нежелательных реакций, в т. ч. не указанных в этом листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите об этом своему лечащему врачу или работнику аптеки.

Немедленно сообщите врачу, если заметите появление следующих симптомов:

ЛП-№002126-ГП-BY
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 07.08.2026 № 911
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0029

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

– внезапное появление хрипов, затруднения дыхания или чувства стеснения в грудной клетке;
– отек век, лица или губ;
– зуд по всему телу, покраснение кожи или зудящие красные пятна;
– кожная сыпь;
– тяжелые кожные реакции, такие как сыпь с образованием волдырей (может захватывать полость рта и язык).

Препарат Дифлюкан может оказать неблагоприятное воздействие на печень. Признаки нарушения функции печени могут быть редкими и включают:
– усталость;
– потерю аппетита;
– рвоту;
– желтушное окрашивание кожных покровов или склер глаз (желтуха).

При развитии любого из указанных состояний следует прекратить прием препарата Дифлюкан и **незамедлительно обратиться к врачу.**

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Дифлюкан:
если какие-либо из указанных далее нежелательных реакций начинают Вас серьезно беспокоить, или Вы заметили у себя появление каких-либо нежелательных реакций, не указанных в данном листке-вкладыше, сообщите об этом своему лечащему врачу или работнику аптеки.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
– головная боль;
– дискомфорт в желудке, диарея, тошнота, рвота;
– повышение биохимических показателей в анализах крови, отражающих функцию печени;
– сыпь.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):
– снижение количества эритроцитов, что может проявляться в виде бледности кожных покровов, слабости или одышки;
– пониженный аппетит;
– бессонница, сонливость;
– судороги, головокружение, ощущение вращения (вертиго), чувство пощипывания, покалывания или онемения, изменения вкуса;
– запор, затруднение пищеварения (диспепсия), метеоризм, сухость во рту;
– боль в мышцах (миалгия);
– повреждение печени и пожелтение кожных покровов и склер (желтуха);
– папулы, волдыри (крапивница), зуд, повышенное потоотделение;
– усталость, общее чувство недомогания, лихорадка.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):
– снижение количества лейкоцитов (клеток крови, которые помогают защитить организм от развития инфекций) и тромбоцитов (клеток крови, которые помогают останавливать кровотечение);
– покраснение кожи или окрашивание кожи в багровый цвет, что может быть обусловлено низким содержанием тромбоцитов или другими изменениями клеток крови;
– изменения биохимического состава крови (высокий уровень холестерина, жиров в крови);

ЛП-№002126-ГП-BY
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 07.08.2026 № 911
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

- низкий уровень калия в крови;
- дрожь (тремор);
- патологические изменения на электрокардиограмме (ЭКГ), изменение частоты сердечных сокращений или ритма;
- печеночная недостаточность;
- аллергические реакции (иногда тяжелые), в том числе распространенная сыпь с образованием волдырей и шелушением кожи, или тяжелые кожные реакции, отек губ или лица;
- выпадение волос (алопеция).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- реакция гиперчувствительности с кожной сыпью, лихорадкой, увеличением лимфоузлов, повышением количества одного из видов белых кровяных телец (эозинофилия) и воспалением внутренних органов (печени, легких, сердца, почек и толстого кишечника) (реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром)).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 578-02-20
Эл. почта: info@roszdravnadzor.gov.ru
или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а
Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242-00-29
Эл. почта: rcpl@rceth.by
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rceth.by

Республика Армения

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО
Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5
Тел.: +374 (10) 23-16-82, 23-08-96; +374 (60) 83-00-73
Эл. почта: info@ampra.am
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pharm.am

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова 13 (БЦ "Нурсаулет 2")
Тел.: +7 (7172) 235-135

ЛП-№002126-ГП-BY
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 07.08.2026 № 911
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0020

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Эл. почта: farm@dari.kz
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.ndda.kz/

Кыргызская Республика
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25
Тел.: +996 (312) 21-05-08
Эл. почта: vigilance@dlsmi.kg
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.dlsmi.kg

5. Хранение препарата Дифлюкан

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере и картонной пачке после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 30°С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Дифлюкан содержит
Действующим веществом является флуконазол.

Каждая капсула содержит 150 мг флуконазола.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактоза, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, натрия лаурилсульфат; капсульная оболочка: титана диоксид (Е 171), краситель синий патентованный (Е 131), желатин; чернила для нанесения маркировки на капсулы: шеллак, краситель оксид железа черный (Е 172), пропиленгликоль, аммиака раствор концентрированный, калия гидроксид.

Препарат Дифлюкан содержит лактозу и натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Дифлюкан и содержимое упаковки
Капсулы.

Твердые непрозрачные желатиновые капсулы № 1 со светло-бирюзовыми крышкой и корпусом, с маркировкой в виде логотипа «Pfizer» и «FLU-150» черного цвета.

Содержимое капсул: порошок от белого до бледно-желтого цвета.

По 1 или 4 капсулы в блистере из ПВХ/ алюминиевой фольги; 1 или 2 блистера по 1 капсуле; 1 блистер по 4 капсулы вместе с листком-вкладышем в картонной пачке с контролем первого вскрытия.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения
Соединенные Штаты Америки
Пфайзер Инк. / Pfizer Inc.
Адрес: 66 Хадсон Бульвар Ист, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10001-2192 / 66 Hudson Boulevard East, New York, N.Y. 10001-2192

ЛП-№002126-ГП-BY
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 07.08.2026 № 911
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0020

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.05.2026 № 10074
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018)

Тел.: +1 (212) 733-23-23
Эл. адрес: https://www.pfizer.com/contact/email

Производитель
Франция
Фарева Амбуаз / Fareva Amboise
Адрес: Зон Эндюстриэль-29 рут дез Эндюстри, 37530 Посе-Сюр Сис / Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530, Pocé-sur-Cisse

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация (а также для Республики Армения и Кыргызской Республики)
ООО «Пфайзер Инновации»
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287-50-00
Факс: +7 (495) 287-53-00
Эл. почта: Russia@pfizer.com

Республика Беларусь
Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Pfizer Export B.V.» (Королевство Нидерландов) в Республике Беларусь
Адрес: 220036, г. Минск, пр. Дзержинского 8, офис 403
Тел.: +375 (17) 309-38-00
Факс: +375 (17) 309-38-19
Эл. почта: belarusro@pfizer.com

Республика Казахстан
Филиал компании Pfizer Export B.V. (Пфайзер Экспорт Би.Ви.) в Республике Казахстан
Адрес: 050000, г. Алматы, Медеуский район, пр. Н. Назарбаева, д. 100/4
Тел.: +7 (727) 250-09-16
Факс: +7 (727) 250 42 09
Эл. почта: PfizerKazakhstan@pfizer.com

Прочие источники информации
Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).